

NOTICE PATIENT

Document fictif à usage pédagogique — inspiré de la structure d'une notice Vidal

METFORMINE

Glucophage® 850 mg, comprimé pelliculé — Antidiabétique oral (biguanide)

DCI	Nom commercial	Classe
Metformine (chlorhydrate de)	Glucophage® 850 mg	Antidiabétique oral — biguanide

Indications

Traitement du diabète de type 2, en particulier chez les patients en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls ne suffisent pas à contrôler la glycémie.

Contre-indications

- Insuffisance rénale sévère (débit de filtration glomérulaire < 30 mL/min)
- Acidose métabolique aiguë ou chronique, notamment acidocétose diabétique et acidose lactique
- Insuffisance hépatique sévère
- Affections aiguës susceptibles d'altérer la fonction rénale : déshydratation, infection sévère, choc
- Hypersensibilité connue à la substance active

Effets indésirables

Très fréquents (>1 patient sur 10) :

- Troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales — surviennent généralement en début de traitement et sont le plus souvent transitoires.

Fréquents (1 à 10 patients sur 100) :

- Altération du goût (goût métallique en bouche).

Rares mais graves — à signaler immédiatement :

- Acidose lactique : urgence médicale (crampes musculaires, douleurs abdominales, fatigue intense, difficultés respiratoires).
- Baisse du taux de vitamine B12 en cas de traitement prolongé, pouvant nécessiter une supplémentation.

Interactions médicamenteuses

- Produits de contraste iodés : la metformine doit être interrompue avant et après un examen avec injection de produit de contraste iodé (risque d'insuffisance rénale aiguë et d'acidose lactique).
- Alcool : majore le risque d'acidose lactique, en particulier en cas de jeûne ou de dénutrition.
- Diurétiques, notamment diurétiques de l'anse : risque d'altération de la fonction rénale, à surveiller.
- Corticoïdes et bêta-2 agonistes : peuvent augmenter la glycémie et nécessiter une adaptation de la posologie.
- Anticoagulants (ex. héparines de bas poids moléculaire) : pas d'interaction pharmacologique directe connue, mais vigilance accrue en cas d'altération de la fonction rénale associée.

Précautions particulières

- Surveillance régulière de la fonction rénale, en particulier chez le patient âgé.
- Arrêt temporaire recommandé en cas de chirurgie programmée ou d'examen avec injection de produit de contraste iodé.
- Éducation du patient sur les signes d'alerte de l'acidose lactique.

Source de référence à consulter pour une information à jour : Vidal.fr — fiche Metformine (vidal.fr/medicaments.html).

Document fictif à usage pédagogique — atelier de décodage de notice de médicament (IDE).